

Cukrinio diabeto ir tarpinės hiperglikemijos diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo  
11 priedas

**VAIKŲ, SERGANČIŲ PIRMOJO ARBA ANTROJO TIPO CUKRINIŲ DIABETU, STEBĖSENOS RODIKLIŲ SIEKTINOS REIKŠMĖS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Vaikų, sergančių pirmojo arba antrojo tipo cukriniu diabetu, stebėsenos rodikliai (toliau – rodiklis)</b>	<b>Rodiklių siektinos reikšmės</b>
1.	Savikontrolės būdu nustatomas gliukozės kiekis kapiliariniame kraujyje ir (ar) matuojant nuolatinį gliukozės jutikliu: 1.1. prieš valgį; 1.2. po valgio (2 valandos nuo valgio pradžios); 1.3. prieš miegą; 1.4. sunki (kurią reikėtų gydyti) ir (ar) naktinė hipoglikemija; 1.5. lengva / vidutinė hipoglikemija	4–7 mmol/l; 5–10 mmol/l;  4,4–7,8 mmol/l; nėra;  nėra arba per savaitę pasireiškė lengva ar vidutinė hipoglikemija ne daugiau kaip 2 kartus (fiksuota glikemija mažesnė negu 3,9 mmol/l).
2.	2.1. HbA1c reikšmė  2.2. gliukozės kiekio kraujyje svyravimai, naudojant nuolatinį gliukozės jutiklius	< 7,0 proc. (53 mmol/mol) be sunkių hipoglikemijos epizodų; tikslinėse gliukozės kiekio kraujyje ribose > 70 proc. laiko; laikas esant hipoglikemijai < 4 proc.
3.	Arterinis kraujo spaudimas	< 90 procentilių pagal amžių, lytį ir ūgį.
4.	Fizinės būklės vertinimas pagal augimo kreives (svorio ir ūgio priklausomybė, kūno masės indeksas)	< 90 procentilių pagal amžių ir lytį.
5.	Lipidograma: 5.1. MTL cholesterolis; 5.2. DTL cholesterolis; 5.3. trigliceridai	< 2,6 mmol/l; > 0,91 mmol/l; < 1,7 mmol/l.