

Cukrinio diabeto ir tarpinės hiperglikemijos diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo  
4 priedas

## NĖŠČIŪJŲ CUKRINIO DIABETO IR CUKRINIO DIABETO NĖŠTUMO LAIKOTARPIU NUSTATYMO TVARKA

Eil. Nr.	Nėštumo periodai (savaitės, dienos)	Atliekami tyrimai ir jų vertinimas
1.	Pirmojo vizito pas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros gydytoją ar gydytoją akušerį ginekologą metu, jei kreipėsi iki 24 (+0 d.) nėštumo savaitės	<p>1.1. Visoms nėščiosioms iki 9 val. ryto atliekamas gliukozės kiekio veninio kraujo plazmoje tyrimas nevalgius, kai nėščioji nevalgiusi 8–14 valandų:</p> <p>1.1.1. jei glikemija nevalgius yra lygi 5,1–6,9 mmol/l, nėščiajai diagnozuojamas nėščiujų diabetas (toliau – ND);</p> <p>1.1.2. jei glikemija nevalgius yra 6,1–6,9 mmol/l, nėščiajai papildomai atliekamas 2 taškų GTM patikslinti dėl galimo tikrojo cukrinio diabeto nėštumo laikotarpiu (toliau – CD nėštumo laikotarpiu);</p> <p>1.2. CD nėštumo laikotarpiu diagnozuojamas, kai:</p> <p>1.2.1. atlikus 2 taškų GTM, jo rezultatai atitinka CD diagnostinius kriterijus, nurodytus Cukrinio diabeto ir tarpinės hiperglikemijos diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 2 priede, arba</p> <p>1.2.2. rytinė glikemija nevalgius lygi 7,0 mmol/l arba didesnė atlikus bent 2 glikemijos tyrimus ne tą pačią dieną, arba</p> <p>1.2.3. atsitiktinė (nevalgius ar pavalgius) glikemija lygi 11,1 mmol/l arba didesnė.</p>
2.	24 (+ 0 d.) – 28 (+ 6 d.) savaitę	<p>2.1. Visoms nėščiosioms, kurioms pirmo vizito metu nenustatytas ND ir nediagnozuotas CD nėštumo laikotarpiu atliekamas 3 taškų GTM, iki 9 val. ryto, kai moteris nevalgiusi 8–14 valandų:</p> <p>2.1.1. ND diagnozuojamas, jei glikemija atitinka nors vieną iš šių kriterijų:</p> <p>2.1.1.1. glikemija nevalgius yra 5,1–6,9 mmol/l;</p> <p>2.1.1.2. glikemija 1 val. po 75 g gliukozės krūvio lygi 10,0 mmol/l arba didesnė;</p> <p>2.1.1.3. glikemija 2 val. po 75 g gliukozės krūvio yra 8,5–11,0 mmol/l;</p> <p>2.1.2. CD nėštumo laikotarpiu diagnozuojamas pagal Aprašo 2 priedą;</p> <p>2.2. jei GTM nebuvo atliktas šiame punkte nurodytu laikotarpiu, 3 taškų GTM atliekamas vėliau.</p>