

Cukrinio diabeto ir tarpinės hiperglikemijos diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo 5 priedas

ANTROJO TIPO CUKRINIAM DIABETUI GYDYTI SKIRIAMŲ VAISTŲ GRUPĖS, ESANT GRETUTINĖMS LIGOMS AR SVEIKATOS SUTRIKIMAMS

Eil. Nr.	Liga ar sveikatos sutrikimas	Patvirtinantys duomenys	Vaistų grupės
1.	Kraujotakos sistemos (širdies ir (ar) kraujagyslių) liga (toliau – ŠKL)	Nustatyta: persirgta miokardo infarktas, insultas, praeinantis galvos smegenų kraujotakos sutrikimas, vainikinių arterijų liga, atliktas vainikinių arterijų plėtimas, trombolizė, stentavimas ar šuntavimas (-ai), periferinių kraujagyslių liga, nestabili krūtinės angina, esant pakitimams elektrokardiogramoje, miokardo išemija krūvio mėginio metu.	GLP-1 SGLT-2 inhibitoriai
2.	ŠKL rizikos veiksniai	Amžius ≥ 55 metų ir kairiojo skilvelio hipertrofija arba vainikinių, miego ar kojų arterijų stenozė $> 50\%$, aGFG < 60 ml min./ $1,73$ m ² , arba albuminurija.	GLP-1 SGLT-2 inhibitoriai
3.	Širdies nepakankamumas (toliau – ŠN)	Nustatytas ŠN su sumažėjusia išstūmio frakcija (IF < 45 proc.).	SGLT-2 inhibitoriai
4.	Lėtinė inkstų liga (toliau – LIL)	LIL kai aGFG < 60 ml min./ $1,73$ m ² arba albuminurija > 30 mg/24 val., arba albumino ir kreatinino santykis > 3 mg/mmol.	SGLT-2 inhibitoriai GLP-1