


Cukrinio diabeto ir tarpinės hiperglikemijos diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo 7 priedas

### GYDYMO INTENSYVINIMAS INJEKCIINIAIS PREPARATAIS



Skiriami 2 ar 3 vaistai CD gydyti, iš kurių vienas yra GLP-1 analogas (ar be jų, jei GLP-1 kontraindikuotini), nepasiekiami individualizuota tiksline HbA1c reikšmė (kai HbA1c yra viršijantis tikslinį arba kai yra GLP-1 analogų vartojimo kontraindikacijų)

Svarstyti insulino terapiją kaip pirmo pasirinkimo gydymą

Jeif HbA1c >11 proc.  
Yra insulino nepakankamumo požymių:  
podipsija, poliurija, svorio mažėjimas

PASTABOS:

- <sup>1</sup> Jeigu skiriami DPP-4 inhibitoriai, padedant GLP-1 analogų vartojimą, jie nutraukiami;
- <sup>2</sup> jei serga ŠKL, rekomenduojami GLP-1 analogai, jei nebuvo paskirti iki tol;
- <sup>3</sup> nutraukti TZD;
- <sup>4</sup> atkreipti dėmesį, kad didesnė hipoglikemijos ir (ar) kūno masės didėjimo rizika.