

Cukrinio diabeto ir tarpinės hiperglikemijos diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo 9 priedas

**SUAUGUSIŲJŲ (IŠSKYRUS NĖŠČIAŠIAS), SERGANČIŲ PIRMOJO TIPO
CUKRINIŲ DIABETU ARBA ANTOJO TIPO CUKRINIŲ DIABETU,
STEBĖSENOS RODIKLIŲ SIEKTINOS REIKŠMĖS**

Eil. Nr.	Suaugusiųjų (išskyrus nėščiąsias), sergančių pirmojo tipo cukriniu diabetu arba antrojo tipo cukriniu diabetu, stebėsenos rodikliai (toliau – rodiklis)	Rodiklių siektinos reikšmės
1.	Savikontrolės būdu nustatomas gliukozės kiekis kapiliariniame kraujyje Glikemijos tyrimo rezultatai: 1.1. prieš valgį; 1.2. po valgio (2 val. nuo valgio pradžios); 1.3. sunki (kurią reikėtų gydyti) ir (ar) naktinė hipoglikemija	4,4–7,0 mmol/l 4,4–8,5 mmol/l Nėra.
2.	HbA1c	Atsižvelgiant į Aprašo 1 priede nurodytus kriterijus, nustatoma individualizuota tikslinė HbA1c reikšmė.
3.	Arterinis kraujo spaudimas	Iki 130/80 mm Hg arba individualus.
4.	Lipidograma: 4.1. didelio tankio lipoproteinai; 4.2. trigliceridų kiekis; 4.3. mažo tankio lipoproteinai	> 1,0 mmol/l (vyrams); > 1,3 mmol/l (moterims); < 1,7 mmol/l; < 2,6 mmol/l (esant vidutinei kraujotakos sistemos (širdies ir kraujagyslių) ligų (toliau – ŠKL) rizikai); < 1,8 mmol/l (esant didelei ŠKL rizikai); < 1,4 mmol/l (esant labai didelei ŠKL rizikai).